

# MeteoGaz®

STICK DE POUDRE ORODISPERSIBLE  
PRÉVIENT LE GONFLEMENT GASTRO-INTESTINAL  
PRÉVIENT LES SYMPTÔMES ASSOCIÉS AUX BALLONNEMENTS ET FLATULENCES

## 1. Identification, composition et indication de MeteoGaz®

**MeteoGaz®** est un dispositif médical qui prévient l'accumulation de gaz et les symptômes associés aux ballonnements.

### 1.1 Mécanisme d'action

**MeteoGaz®** est composé de deux polymères présents en quantité équivalente. Si en apparence leurs propriétés adsorbantes et tensioactives semblent similaires, leurs mécanismes d'actions diffèrent en partie, et leur combinaison apparaît comme synergique.

La siméticone agit principalement comme un agent anti-mousse, rompant les bulles de gaz qui se forment à la surface des sécrétions gastro-intestinales, puis en adsorbant le gaz. Le polyvinylpyrrolidone, en plus de posséder une grande capacité d'adsorption des gaz, forme une fine couche protectrice sur les parois de l'intestin, qui aide à diminuer l'irritation de la muqueuse gastro-intestinale fréquemment associée à la surproduction de gaz.

### 1.2 Composition

**MeteoGaz®**, stick orodispersible, contient une association de deux substances inertes à grande capacité d'adsorption de gaz et d'activité tensioactive.

**MeteoGaz®** est utilisé pour réduire l'excès de gaz intestinal ainsi qu'en cas de flatulences associées à la sensation d'inconfort digestif après les repas et à l'aérophagie.

### **MeteoGaz®** contient :

siméticone et polyvinylpyrrolidone

**Excipients** : sorbitol, arôme fraise, dioxyde de silicone, acide citrique, sucralose.

## 2. Conditionnement

Chaque boîte de **MeteoGaz®** contient 10 sticks de poudre orodispersible.

## 3. Conseils et conditions d'utilisations

Il est recommandé de prendre **MeteoGaz®** jusqu'à la disparition des symptômes.

**Conseils d'utilisation** : Prendre 1 stick deux fois par jour maximum, de préférence après les repas du midi et du soir. A dissoudre directement dans la bouche.

**Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne pas utiliser avant 15 ans.**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.**

**Pour les adolescents âgés entre 15 et 18 ans, demandez conseil à un médecin.**

## 4. Effets secondaires

Aucun effet secondaire rapporté aux doses recommandées. L'utilisation à des doses supérieures peut causer des constipations. Dans la plupart des cas, cet effet secondaire disparaît dans les jours suivants l'arrêt du traitement. Si les symptômes persistent plus de 3 jours après l'arrêt du traitement, consultez votre médecin.

## 5. Interactions avec compléments alimentaires et médicaments

Pour les composants de **MeteoGaz®**, il n'est connu aucune interaction avec les compléments alimentaires. Cependant, de manière générale, tout complément alimentaire, incluant les vitamines, les nutriments et les plantes, doit être pris 2 heures avant ou 2 heures après la prise de **MeteoGaz®**.  
Dû à la présence d'adsorbants, **MeteoGaz®** peut retarder ou réduire l'absorption des médicaments pris simultanément. Pour exemple, des interactions avec des antiacides, des antibiotiques, et des antidiabétiques ont été rapportées. Prendre **MeteoGaz®** au moins 2 heures avant ou 2 heures après la prise de tout autre médicament ou pilule contraceptive. Dans tous les cas, il est hautement recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser un dispositif médical adsorbant tel que **MeteoGaz®**.

## 6. Précautions d'utilisation

Ne pas utiliser avant 15 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Ne pas dépasser la dose recommandée, ce qui pourrait engendrer des constipations. La dose recommandée est suffisante pour traiter à la fois la présence indésirable de simple excès de gaz intestinaux et la surproduction de gaz dans des cas plus complexes tels que le syndrome de l'intestin irritable, les troubles dyspeptiques et les ballonnements post prandial.

La durée de traitement est variable en fonction de la cause des ballonnements.

Chaque stick est à usage unique et doit être ouvert seulement au moment de l'utilisation.

Ne pas prendre en cas d'intolérance au produit.

Ne pas prendre en cas d'hypersensibilité connue à la siméticone ou au polyvinylpyrrolidone, ou à tout autre composé du produit.

## 7. Conditions de stockage

Conserver **MeteoGaz®** dans un endroit sec et à l'abri de toutes sources de chaleur ou de lumière. Ouvrir le stick uniquement avant son utilisation immédiate. Ne pas utiliser si le stick est endommagé.

Garder hors de portée des enfants.

Conserver à une température inférieure à 25°C.

## 8. Date d'expiration

Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur la boîte.

Respecter les conditions de conservation et de stockage.

## 9. Élimination

Le dispositif arrivé à expiration doit être pris en charge en vertu des réglementations locales en matière de traitement des déchets.

En tous les cas, ne pas éliminer le produit ou son conditionnement dans l'environnement.

Votre opinion est importante pour nous ! S'il vous plaît, prenez 5 minutes pour compléter le questionnaire sur cette adresse ou scannez le QR code. Cela nous aidera à évaluer votre niveau de satisfaction concernant le Produit.

[www.siiit-pms.com/meteogaz](http://www.siiit-pms.com/meteogaz)



**MeteoGaz® EST UN DISPOSITIF  
MÉDICAL DE CLASSE IIA**

### Information médicale :

France : +33 (0)1 34 80 72 60

**DERNIÈRE RÉVISION : Octobre 2023**



Distributeur :  
**Laboratoires Mayoly Spindler**  
6 avenue de l'Europe  
78400 CHATOU - France

 **SIIT srl**  
Via Ariosto 50/60 - 20090 Trezzano  
sul Naviglio (MI) - Italie



7181043  
03007607/4